

ORDEN	OBJETO	ETAPA	MOMENTO	TIPO DE MUESTRA	TAMAÑO DE MUESTRA	PRUEBA	COMENTARIOS
1	DEFINIR ESTATUS DE LA GRANJA	Pié de Cría	*4 semanas de vida	Fluidos Orales	Tres (3) corrales por galpón, una cuerda por corral	ELISA	*NOTA: EL PIÉ DE CRÍA SE EVALÚA AL INGRESO DE LOS ANIMALES AL PRECEBO, YA QUE SI LAS HEMBRAS TUVIERON CONTACTO CON EL VIRUS, LOS LECHONES SERÁN POSITIVOS POR ANTICUERPOS CALOSTRALES
		Precebo	10 semanas de vida				
		Ceba	14 semanas de vida				
		Autoreemplazo Segregado	14 semanas de vida				
2	DEFINIR DONDE CIRCULA EL VIRUS	Pie de Cría	Al parto	“Fluidos de testículos o si no se castra, fluidos de lenguas de nacidos muertos”	Pooles de máximo 30	PCR	
		Maternidad	Al destete	Fluidos orales familiares hembra y lechones	Tres (3) corrales por galpón, una cuerda por corral		

# SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN

# DE LA GRANJA



ORDEN	OBJETO	ETAPA	MOMENTO	TIPO DE MUESTRA	TAMAÑO DE MUESTRA	PRUEBA	COMENTARIOS
1	CONFIRMAR EFECTIVIDAD INOCULACIÓN	Hembras de Reemplazo	3 - 5 días post inoculación	Fluidos orales	Todos los corrales con las hembras inoculadas, una cuerda por corral	PCR	SI HAY RESULTADOS NEGATIVOS REPETIR INOCULACIÓN
			15 días post inoculación			ELISA	SI HAY RESULTADOS NEGATIVOS ESPERAR SEROCONVERSIÓN Y HACER NUEVO MUESTREO EN 7 DIAS
2	CONFIRMAR PRODUCCIÓN LECHONES NEGATIVOS (20 SEMANAS POST INOCULACIÓN)	Pié de Cría	<b>1)</b> Al Parto <b>2)</b> Si la programación es en bandas, tres (3) muestreos negativos consecutivos <b>3)</b> Si la programación es semanal, nueve (9) muestreos negativos consecutivos	Fluidos de testículos o si no se castra, fluidos de lenguas de nacidos muertos	Pooles de máximo 30	PCR	SI HAY RESULTADOS POSITIVOS, SE DEBE VOVER A MUESTREAR EN LA SIGUIENTE BANDA O 14 DÍAS DESPUÉS
3	CONFIRMAR NO CIRCULACIÓN VIRAL	Maternidad	<b>1)</b> Al Destete <b>2)</b> Si la programación es en bandas, tres (3) muestreos negativos consecutivos <b>3)</b> Si la programación es semanal, nueve (9) muestreos negativos consecutivos	Fluidos orales familiares (Hembra y sus lechones)	Seis (6) corrales por galpón, una cuerda por corral y si hay menos de seis (6) corrales se muestrean todos, una cuerda por corral	PCR	SI HAY RESULTADOS POSITIVOS, SE DEBE VOLVER A MUESTREAR EN LA SIGUIENTE BANDA O 14 DÍAS DESPUÉS