Calle 37 # 16-52
Bogotá, Colombia

(+57) (1) 248 6777
contacto@porkcolombia.co
www.porkcolombia.co

Boletín epidemiológico porcícola

III trimestre 2026





1 Notificaciones de cuadros clínicos compatibles con PPC

2 Vacunación — Zona Control


3 Identificación animal

4 Nota Sanitaria — Neumonía Enzoótica Porcina

1. Notificaciones de cuadros clínicos compatibles con PPC

La **peste porcina clásica (PPC)** es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos y silvestres. Colombia mantiene zonas libres reconocidas; en otras se aplica el biológico como estrategia de control.

Cuadros Clínicos compatibles con PPC y vesicular



63
Notificaciones compatibles con PPC (Julio - Septiembre 2026)

Distribución por zonas epidemiológicas

12
Zonas libres de PPC

38
Zona Control de PPC

13
Zona en Erradicación de PPC

Notif. cuadro clínico vesicular (Enero a septiembre 2026)

2	4	1
En proceso	Seneca virus	Negativo a Fiebre Aftosa

2. Vacunación — Zona Control

Animales vacunados
III trimestre

2025	2026
830.740	894.025

+7,6%

Predios vacunados
III trimestre

2025	2026
66.861	71.681

+6,8%

3. Identificación animal

Animales identificados
III trimestre

2025	2026
2.369.278	2.541.891

+6,8%


Calle 37 # 16-52
Bogotá, Colombia

(+57) (1) 248 6777
contacto@porkcolombia.co
www.porkcolombia.co

4. Nota Sanitaria

Neumonía Enzoótica Porcina

La neumonía enzoótica porcina (NEP) se caracteriza por una bronconeumonía crónica, alta morbilidad, baja mortalidad y disminución del rendimiento productivo. Su impacto económico se relaciona con la reducción de la ganancia diaria de peso, el aumento del índice de conversión alimenticia y el mayor número de días para alcanzar el peso de comercialización. Afecta principalmente levante y finalización. Mycoplasma hyopneumoniae coloniza el epitelio respiratorio y favorece coinfecciones (P. multocida, S. suis, . parasuis) y el complejo respiratorio porcino (PRRSV, PCV2).



Pulmón con consolidación Craneoventral por Mycoplasma hyopneumoniae
Zimmerman JJ, et al. Diseases of Swine

AGENTE CAUSAL
Mycoplasma hyopneumoniae

TRANSMISIÓN
Contacto directo

AFECTA A
Levante-Ceba y animales jóvenes

LESIÓN
Consolidación Craneoventral Pulmonar (mucosa hiperplásica)

DIAGNÓSTICO
Histopatología + PCR de hisopado laríngeo, traqueal o bronquial /tejido pulmonar

SIGNOS CLÍNICOS (porcinos)

- Tos seca
- Dificultad respiratoria
- Fiebre

IMPACTO ECONÓMICO

- Baja conversión alimenticia
- Retraso en el crecimiento
- Mortalidad ocasional
- Aumento de costos de producción por tratamientos

CONTROL

- Vacunación de acuerdo con el estatus sanitario de los animales y el objetivo de la granja
- Implementación del sistema de producción todo dentro/todo fuera.
- Aclimatación adecuada de las primerizas.
- Estabilización de la inmunidad del hato.
- Densidades de alojamiento apropiadas.
- Prevención de otras enfermedades respiratorias.
- Condiciones óptimas de alojamiento y ambiente.